

Ptice pjevačice Crne Gore - procjene gnjezdilišnih populacija i trendovi

Birds of Montenegro – breeding population estimates and trends

Saveljić, D., Vizi, O..

REZULTATI

PDQ = ocjena kvaliteta procjene veličine gnjezdilišne populacije

TDQ = ocjena kvaliteta procjene trenda gnjezdilišne populacije

PNG – periodična nova gnjezdarica (periodical new breeder)

RNG – redovna nova gnjezdarica (regular new breeder)

NG – neredovna gnjezdarica na ivici opstanka (irregular breeder)

Ex – izumrla gnjezdarica

| VRSTA Period procene / Ocena kvaliteta procjene | REGION | PROCJENA GNJEZDILIŠNE POPULACIJE | TREND GNJEZDILIŠNE POPULACIJE | |
|--|-----------|--|-------------------------------------|---------------------|
| | | POPmin – POPmax | 1990- 2003 % | Pravac trends-TD |
| Anthus campestris | | | | |
| PDQ – M | CRNA GORA | 300-500 | 1-20% | S |
| Anthus trivialis 1990-2002 | | | | |
| PDQ – M | CRNA GORA | 10.000-15.000 | 1-20% | S |
| Anthus spinoletta 1990-2002 | | | | |
| PDQ – M | CRNA GORA | 2.000-4.000 | 1-20% | S |
| Motacilla flava 1990-2002 | | | | |
| PDQ – M | CRNA GORA | 1.500-2.500 | 1-20% | D |
| Motacilla cinerea 1990-2002 | | | | |

| | | | | |
|---|-----------|---------------|-------|---|
| PDQ – M | CRNA GORA | 3.000-4.000 | 1-20% | S |
| | | | | |
| Motacilla alba 1990-2002 | | | | |
| | | | | |
| PDQ – M | CRNA GORA | 5.000-10.000 | 1-20% | S |
| | | | | |
| Cinclus cinclus 1990-2002 | | | | |
| | | | | |
| PDQ – M | CRNA GORA | 1.000-1.500 | 1-20% | S |
| TDQ – M | | | | |
| Troglodytes troglodytes 1990-2002 | | | | |
| | | | | |
| PDQ – M | CRNA GORA | 20.000-30.000 | 1-20% | S |
| | | | | |
| Prunella modularis 1990-2002 | | | | |
| | | | | |
| PDQ – G | CRNA GORA | 3.000-5.000 | 1-20% | S |
| TDQ – M | | | | |
| Prunella collaris 1994-2002 | | | | |
| | | | | |
| PDQ – G | CRNA GORA | 150-250 | 1-20% | S |
| TDQ – M | | | | |
| Erithacus rubecula 1990-2002 | | | | |
| | | | | |
| PDQ – M | CRNA GORA | 30.000-60.000 | 1-20% | S |
| TDQ – M | | | | |
| Luscinia megarhynchos 1990-2002 | | | | |
| | | | | |
| PDQ – M | CRNA GORA | 40.000-70.000 | 1-20% | F |
| TDQ – M | | | | |
| Luscinia svecica 1998-2002 | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|---|-----------|---------------|--------|---|
| PDQ – G TDQ – M | CRNA GORA | 0 | - | |
| | | | | |
| Phoenicurus ochrurus 1995-2002 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | CRNA GORA | 10.000-15.000 | 20-30% | I |
| PDQ – M TDQ – G | | | | |
| Phoenicurus phoenicurus 1990-2002 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | CRNA GORA | 1.000-2.000 | 1-20% | D |
| PDQ – M | | | | |
| Saxicola rubetra 1990-2002 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | CRNA GORA | 500-800 | 1-20% | F |
| PDQ – M | | | | |
| Saxicola torquata 1990-2002 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | CRNA GORA | 500-1.000 | 1-20% | I |
| PDQ – M | | | | |
| Oenanthe oenanthe 1990-2002 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | CRNA GORA | 4.000-6.000 | 1-20% | F |
| PDQ – M | | | | |
| Oenanthe hispanica 1995-2002 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | CRNA GORA | 500-1.000 | 1-20% | F |
| PDQ – M | | | | |
| Monticola saxatilis 1990-2002 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | CRNA GORA | 300-400 | 1-20% | F |
| PDQ – M | | | | |
| Monticola solitarius | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|--|-----------|---------------|--------|---|
| 1995-2002 | | | | |
| PDQ – M | CRNA GORA | 200-500 | 1-20% | S |
| Turdus torquatus 1990-2002 | | | | |
| PDQ – M | CRNA GORA | 1.500-2.500 | 1-20% | S |
| Turdus merula 1990-2002 | | | | |
| PDQ – M | CRNA GORA | 60.000-80.000 | 1-20% | S |
| Turdus pilaris 1995-2002 | | | | |
| PDQ – M | CRNA GORA | 0 | - | |
| Turdus philomelos 1990-2002 | | | | |
| PDQ – M | CRNA GORA | 40.000-60.000 | 1-20% | S |
| Turdus viscivorus 1990-2002 | | | | |
| PDQ – M | CRNA GORA | 10.000-20.000 | 1-20% | S |
| Cettia cetti 1990-2002 | | | | |
| PDQ – M | CRNA GORA | 100-200 | 10-30% | F |
| Cisticola juncidis 1998-2002 | | | | |
| PDQ – P | CRNA GORA | 5-10 | 10-30% | F |
| Locustella | | | | |

| | | | | |
|--|--------------------|-----------|-------------|--------|
| naevia 1998-2002 | | | | |
| | | | | |
| | PDQ – M | CRNA GORA | 0 | 20-30% |
| Locustella fluviatilis 1995-2002 | | | | |
| | | | | |
| | PDQ – M | CRNA GORA | 0 | - |
| Locustella luscinioides 1995-2002 | | | | |
| | | | | |
| | PDQ – M | CRNA GORA | 20-50 | 1-20% |
| Acrocephalus melanopogon 1997-2002 | | | | |
| | | | | |
| | PDQ – G | CRNA GORA | 0 | - |
| Acrocephalus schoenobaenus 1995-2002 | | | | |
| | | | | |
| | PDQ – M | CRNA GORA | 1.000-1.500 | 1-20% |
| Acrocephalus palustris 1995-2002 | | | | |
| | | | | |
| | PDQ – M | CRNA GORA | 50-100 | 1-20% |
| Acrocephalus scirpaceus 1995-2002 | | | | |
| | | | | |
| | PDQ – M TDQ – M | CRNA GORA | 500-1.000 | 1-20% |
| Acrocephalus arundinaceus 1995-2002 | | | | |
| | | | | |
| | PDQ – M | CRNA GORA | 2.000-2.500 | 1-20% |

| | | | | |
|--|---------|-----------|--------------|-----------|
| Hippolais pallida 1990-2002 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | PDQ – M | CRNA GORA | 1.500-3.000 | 1-20% F |
| Hippolais olivetorum 1995-2002 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | PDQ – M | CRNA GORA | 5-10 | 10-30% F |
| Hippolais icterina 1990-2002 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | PDQ – M | CRNA GORA | 0-10 | 50-100% F |
| Sylvia cantillans 1990-2002 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | PDQ – P | CRNA GORA | 5.000-10.000 | 1-20% S |
| Sylvia melanocephala 1990-2002 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | PDQ – M | CRNA GORA | 2.000-3.000 | 1-20% S |
| Sylvia hortensis 1990-2002 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | PDQ – M | CRNA GORA | 300-600 | 1-20% S |
| Sylvia nisoria 1995-2002 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | PDQ – M | CRNA GORA | 0-50 | 1-20% S |
| Sylvia curruca 1990-2002 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | PDQ – M | CRNA GORA | 4.000-7.000 | 1-20% S |

| | | | | |
|---|-----------|-----------------|-------|---|
| | | | | |
| Sylvia communis 1995-2002 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| PDQ – M | CRNA GORA | 10.000-15.000 | 1-20% | F |
| | | | | |
| Sylvia borin 1995-2002 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| PDQ – M | CRNA GORA | 0 | - | |
| | | | | |
| Sylvia atricapilla 1990-2002 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| PDQ – M | CRNA GORA | 150.000-250.000 | 1-20% | F |
| | | | | |
| Phylloscopus bonelli 1990-2002 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| PDQ – P | CRNA GORA | 50-100 | 1-20% | S |
| | | | | |
| Phylloscopus sibilatrix 1990-2002 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| PDQ – M | CRNA GORA | 1.000-1.500 | 1-20% | S |
| | | | | |
| Phylloscopus collybita 1990-2002 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| PDQ – M | CRNA GORA | 40.000-80.000 | 1-20% | S |
| | | | | |
| Regulus regulus 1990-2002 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| PDQ – M | CRNA GORA | 4.000-7.000 | 1-20% | S |
| | | | | |
| Regulus ignicapillus 1990-2002 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|---|-----------|---------------|-------|---|
| PDQ – M | CRNA GORA | 1.000-2.000 | 1-20% | F |
| | | | | |
| Muscicapa striata 1990-2002 | | | | |
| | | | | |
| PDQ – M | CRNA GORA | 1.000-2.000 | 1-20% | S |
| | | | | |
| Ficedula parva 1990-2002 | | | | |
| | | | | |
| PDQ – M | CRNA GORA | 50-100 | 1-20% | S |
| | | | | |
| Ficedula albicollis 1995-2002 | | | | |
| | | | | |
| PDQ – M | CRNA GORA | 1.000-2.000 | 1-20% | S |
| | | | | |
| Ficedula hypoleuca 2003 | | | | |
| | | | | |
| PDQ – G | CRNA GORA | 0 | - | |
| | | | | |
| Panurus biarmicus 1997-2002 | | | | |
| | | | | |
| PDQ – M | CRNA GORA | 0 | - | |
| | | | | |
| Aegithalos caudatus 1995-2002 | | | | |
| | | | | |
| PDQ – M | CRNA GORA | 10.000-15.000 | 1-20% | S |
| | | | | |
| Parus palustris 1990-2002 | | | | |
| | | | | |
| PDQ – M | CRNA GORA | 15.000-25.000 | 1-20% | S |
| | | | | |
| Parus lugubris 1990-2002 | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|-------------------------------------|-----------|-----------------|-------|---|
| PDQ – M | CRNA GORA | 3.000-5.000 | 1-20% | S |
| | | | | |
| Parus montanus 1990-2002 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| PDQ – M | CRNA GORA | 2.500-4.000 | 1-20% | S |
| | | | | |
| Parus cristatus 1990-2002 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| PDQ – M | CRNA GORA | 1.500-3.000 | 1-20% | F |
| | | | | |
| Parus ater 1990-2002 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| PDQ – M | CRNA GORA | 70.000-100.000 | 1-20% | I |
| | | | | |
| Parus caeruleus 1990-2002 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| PDQ – M | CRNA GORA | 70.000-150.000 | 1-20% | S |
| | | | | |
| Parus major 1990-2002 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| PDQ – M | CRNA GORA | 200.000-400.000 | 1-20% | S |
| | | | | |
| Sitta europaea 1990-2002 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| PDQ – M | CRNA GORA | 50.000-100.000 | 1-20% | S |
| | | | | |
| Sitta neumayer 1997-2002 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| PDQ – M | CRNA GORA | 400-600 | 1-20% | S |
| | | | | |
| Tichodroma muraria | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|---|-----------|---------------|--------|---|
| 1995-2002 | | | | |
| PDQ – G | CRNA GORA | 20-25 | 1-20% | S |
| Certhia familiaris 1990-2002 | | | | |
| PDQ – M | CRNA GORA | 10.000-20.000 | 1-20% | S |
| Certhia brachydactyla 1990-2002 | | | | |
| PDQ – M | CRNA GORA | 15.000-20.000 | 1-20% | S |
| Remiz pendulinus 1995-2002 | | | | |
| PDQ – M | CRNA GORA | 100-200 | 1-20% | S |
| Oriolus oriolus 1990-2002 | | | | |
| PDQ – M | CRNA GORA | 15.000-25.000 | 1-20% | S |
| Lanius collurio 1995-2002 | | | | |
| PDQ – M | CRNA GORA | 10.000-20.000 | 1-20% | D |
| Lanius minor 1995-2002 | | | | |
| PDQ – G | CRNA GORA | 20-50 | 10-20% | D |
| Lanius senator 1995-2002 | | | | |
| PDQ – G | CRNA GORA | 80-100 | 1-20% | F |

| | | | | |
|---|---------|-----------|----------------|--------------|
| Garrulus glandarius 1990-2002 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | PDQ – M | CRNA GORA | 40.000-60.0000 | 1-20% S |
| Pica pica 1990-2002 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | PDQ – M | CRNA GORA | 50.000-70.0000 | 1-20% I |
| Nucifraga caryocatactes 1995-2002 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | PDQ – G | CRNA GORA | 400-700 | 1-20% S |
| Pyrrhocorax graculus 1995-2002 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | PDQ – G | CRNA GORA | 1.000-1.500 | 10-30% I |
| Pyrrhocorax pyrrhocorax 1997-1998 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | PDQ – G | CRNA GORA | 0 | - 1-20% S |
| Corvus monedula 1990-2002 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | PDQ – M | CRNA GORA | 50.000-80.000 | 1-20% S |
| Corvus frugilegus 1990-2002 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | PDQ – M | CRNA GORA | 0 | - |
| Corvus corone cornix 1990-2002 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | PDQ – M | CRNA GORA | 30.000-50.000 | 1-10% I |

| | | | | |
|--|-----------|-----------------|--------|---|
| | | | | |
| Corvus corax 1995-2002 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| PDQ – M | CRNA GORA | 250-350 | 1-20% | I |
| | | | | |
| Sturnus vulgaris 1990-2002 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| PDQ – M | CRNA GORA | 70.000-100.000 | 1-20% | F |
| | | | | |
| Sturnus roseus 1990-2002 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| PDQ – M | CRNA GORA | 0 | - | |
| | | | | |
| Passer domesticus 1990-2002 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| PDQ – M | CRNA GORA | 300.000-600.000 | 1-20% | S |
| | | | | |
| Passer hispaniolensis 1995-2002 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| PDQ – M | CRNA GORA | 800-1.200 | 20-50% | F |
| | | | | |
| Passer montanus 1990-2002 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| PDQ – P | CRNA GORA | 50.000-80.000 | 1-20% | S |
| | | | | |
| Montifringilla nivalis 1997-2000 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| PDQ – G | CRNA GORA | 35-60 | 1-20% | S |
| | | | | |
| Fringilla coelebs 1990-2002 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|---|-----------|-----------------|--------|---|
| PDQ – M | CRNA GORA | 250.000-350.000 | 1-20% | S |
| | | | | |
| Serinus serinus 1995-2002 | | | | |
| | | | | |
| PDQ – M | CRNA GORA | 12.000-20.000 | 1-20% | S |
| | | | | |
| Carduelis chloris 1990-2002 | | | | |
| | | | | |
| PDQ – M | CRNA GORA | 60.000-80.000 | 1-20% | S |
| | | | | |
| Carduelis carduelis 1990-2002 | | | | |
| | | | | |
| PDQ – M | CRNA GORA | 70.000-100.000 | 1-20% | S |
| | | | | |
| Carduelis spinus 1990-2002 | | | | |
| | | | | |
| PDQ – M | CRNA GORA | 30-50 | 1-20% | S |
| | | | | |
| Carduelis cannabina 1995-2002 | | | | |
| | | | | |
| PDQ – M | CRNA GORA | 10.000-15.000 | 1-20% | S |
| | | | | |
| Loxia curvirostra 1995-2002 | | | | |
| | | | | |
| PDQ – M | CRNA GORA | 2.000-3000 | 10-40% | F |
| | | | | |
| Pyrrhula pyrrhula 1995-2002 | | | | |
| | | | | |
| PDQ – M | CRNA GORA | 1.000-1.500 | 1-20% | S |
| | | | | |
| Coccothraustes coccothraustes 1990-2002 | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|--|-----------|--------------|-------|---|
| PDQ – M | | | | |
| | CRNA GORA | 1.500-3.000 | 1-20% | S |
| Emberiza citrinella 1990-2002 | | | | |
| | | | | |
| PDQ – M | CRNA GORA | 7.000-10.000 | 1-20% | S |
| | | | | |
| Emberiza cirrus 1995-2002 | | | | |
| | | | | |
| PDQ – M | CRNA GORA | 4.000-6.000 | 1-20% | S |
| | | | | |
| Emberiza cia 1990-2002 | | | | |
| | | | | |
| PDQ – M | CRNA GORA | 1.500-2.000 | 1-20% | S |
| | | | | |
| Emberiza hortulana 1997-2002 | | | | |
| | | | | |
| PDQ – M | CRNA GORA | 400-800 | 1-20% | S |
| | | | | |
| Emberiza schoeniclus 1995-2002 | | | | |
| | | | | |
| PDQ – M | CRNA GORA | 10-100 | 1-20% | F |
| | | | | |
| Emberiza melanocephala 1995-2003 | | | | |
| | | | | |
| PDQ – M | CRNA GORA | 300-400 | 1-20% | S |
| | | | | |
| Miliaria calandra 1990-2002 | | | | |
| | | | | |
| PDQ – M | CRNA GORA | 3.000-6.000 | 1-20% | S |
| | | | | |